


ULCERE GASTRIQUE ET DUODENALE

ETUDE THEORIQUE:

- C'est la destruction locale de la muqueuse gastrique et/ou duodénal s'étendant jusqu'à la musculieuse.





EPIDEMIOLOGIE :

- U D plus fréquent 8-10% contre 2-3% pour U G.
- Sex-ratio : 2-3 pour UD , 1 UG .
- Age: incidence augmente avec l'âge .
- UD maximum vers 50ans,UG 60 ans.



PATHOGENIE :

- **Un déséquilibre ou dysfonctionnement des moyens de défense de la muqueuse:**
 - Déficit de production de mucus, ou régénération insuffisante de la muqueuse .**
 - Excès de production d'acidité gastrique.**
- Trouble de l'irrigation de la paroi gastrique.**
- _Infection par Helicobacter Pylori .**


Formation de l'ulcère

muqueuse normale

inflammation

Des cellules de la muqueuse
sont endommagées

ulcère






SYMPTOMATOLOGIE:

- Douleurs brûlantes dans la partie haute de l'abdomen.
- Sensation de pression ou de réplétion après les repas .
- Manque d'appétit .
- Nausées,vomissement,crampes d'estomac.
- Intolérance vis-à-vis de certains aliments .
- Perte de poids. -

FACTEURS DE RISQUE:

- _Mauvaise habitudes alimentaires.
- Stress négatif.
- Tabagisme.
- Médicaments.





FORMES CLINIQUES

- *_Ulcère non compliqué .*
- *Formes atypiques.*
- *Formes compliquées.*




PLACE DE L'ENDOSCOPIE

- Découverte de la :
lésion, localisation, description.
- Réalisation de biopsie .
- Élimination des diagnostics différentiels.
- Surveillance de l'ulcère .
- Diagnostique et traitement des complications.

TRAITEMENT :

- BUT: Calmé la douleur, accéléré le cicatrisation.
- Prévenir les complication.
- Diminue le risque des récives, voir obtenir la guérison définitive.





MESURES GENERALES

- Des repas réguliers ,légers,équilibrés.
- Réduire la consommation de café et de thé noir.
- Arrêt de la consommation tabagique .
- Gérer les situations de stress.



MOYENS:

- TRAITEMENT D'ERADICATION

BACTERINNE : par une bi antibiothérapie

- TRAITEMENT ANTI- ULCEREUX: Par les anti-acides (anti H₂, IPP, mucoprotecteurs)
- Contrôle endoscopique (obligatoire pour l'ulcère gastrique).